

Bortrac (B 150 g/l)

NAWÓZ FORMUŁOWANY

Gwarantowana zawartość: **10,9% = 150 g/l boru (B) rozpuszczalnego w wodzie**

Boroetanolamina

Nawóz formułowany do stosowania nalistnego lub doglebowego. Zaleca się stosowanie w zapobieganiu niedoborom boru oraz dla poprawy wysokości i jakości plonu.

Nawóz WE

UWAGA: Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety. Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie u dystrybutora.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.

Producent: Yara UK Ltd , Pocklington, York YO42 1DN, U.K.
Tel: +44 1759 302545 Fax: +44 1759 303650

P103: Przed użyciem przeczytać etykiety.

P102: Chronić przed dziećmi.

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykiety.

zawartość netto

20 litrów • masa netto **23,04** kg

SUMI AGRO POLAND Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
tel. +48 22 637 32 37, fax: 22 637 32 38
e-mail: biuro@sumiagro.pl, www.sumiagro.pl

Importer:



Nr partii: Szczegóły znajdują się na opakowaniu

Bortrac (B 150 g/l)

DAWKI I TERMINY STOSOWANIA STOSOWANIE NALISTNE

Burak cukrowy, burak ćwikłowy: Produkt można stosować jednokrotnie – w fazie 4 liści właściwych – 1-3 l/ha, lub dwukrotnie – w fazie 4-6 liści właściwych – 1 l/ha oraz przed zwarciem międzyrzędzi – 2 l/ha. Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
Rzepak ozimy, rzepak jary: Produkt można stosować jednokrotnie – w fazie wzrostu pędu głównego (BBCH 31-33) – 3 l/ha, lub dwukrotnie – w fazie 4-6 liści właściwych (BBCH 13-15) – 1 l/ha, oraz w fazie wzrostu pędu głównego – 1-2 l/ha. Nie stosować w okresie kwitnienia.

Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Ziemiaki: Oprysk dawką 1 l/ha tydzień po całkowitych wschodach roślin na plantacji. Przy silniejszych niedoborach zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Kukurydza: 2-3 l/ha w fazie 6 – liści właściwych. Przy silniejszych niedoborach zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Groch, fasola: 2 l/ha na rośliny wysokości 10 – 15 cm. Przy silniejszych niedoborach zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Kapusta, kapusta brukselska, kalafior, brokuł: 2-3 l/ha w fazie 4-6 liści właściwych. Przy silniejszych niedoborach zabieg powtórzyć po 10-14 dniach. Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Cebula: 1 l/ha przy dostatecznie rozwiniętej do przyjęcia oprysku powierzchni liści. Zabieg korzystnie jest powtórzyć po 10-14 dniach. Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Marchew: 3 l/ha na rośliny wysokości 10-15 cm lub przy dostatecznie rozwiniętej do przyjęcia oprysku powierzchni liści. Przy silniejszych niedoborach zabieg powtórzyć po 10-14 dniach. Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Salata (gruntowa): 1-2 l/ha 10-14 dni po sadzeniu lub wschodach. Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Jabłoń, grusza: 1 l/ha w fazie różowego pąka i ponownie w czasie opadania płatków kwiatowych. 2 l/ha po zbiorach owoców ale przed rozpoczęciem żółknięcia (starzenia) liści.
Zalecana ilość wody: 500 – 700 l/ha.

Wiśnia, czereśnia, śliwa: 1 l/ha w fazie różowego pąka. 2 l/ha po zbiorach ale przed rozpoczęciem żółknięcia (starzenia) liści.
Zalecana ilość wody: 500 – 700 l/ha.

Truskawki (gruntowe): 2 zabiegi dawką 1 l/ha: na biały pąk i ponownie po 10-14 dniach. Ponadto korzystnie jest wykonać zabieg po zbiorach dawką 2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.

STOSOWANIE DOGLEBOWE

Wszystkie uprawy: 5 l/ha przed sadzeniem lub przed wschodami w odpowiedniej ilości wody.

ZALECENIA W STOSOWANIU

ZAWSZE STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI ZAWARTYCH W ETYKIECIE

Zawartością opakowania przed użyciem kilkakrotnie wstrząsnąć. Nawóz należy wlewać poprzez filtr do zbiornika opryskiwacza wypełnionego w 3/4 objętości wody (z włączonym mieszadłem). Po uzupełnieniu zbiornika do pełnej objętości wody utrzymywając pracę mieszadła do zakończenia oprysku. Wszystkie elementy opryskiwacza powinny być czyste i prawidłowo ustawione. Nie należy pozostawiać cieczy roboczej w opryskiwaczu w czasie przerw na posiłki, lub na noc.

Mieszanie z innymi produktami: Należy dokładnie poznać się z etykietami produktów i stosować się ściśle do zawartych w nich instrukcji w zakresie łącznego stosowania z innymi produktami. Za działanie łącznie stosowanych produktów odpowiada użytkownik.

W przypadku wątpliwości, wskazane jest zastosowanie nieznannej mieszanki na ograniczonym areale. Przed sporządzeniem mieszanki produktów zalecamy kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu.

Środki ostrożności: Nie stosować na uprawy pod osłonami. Należy unikać skrajnych warunków pogodowych, takich jak: wysoka temperatura, wysoka wilgotność, susza, przymrozek, deszcz. Podczas stosowania produktu używać rękawic i okularów ochronnych. Opryskiwacz należy po zabiegu umyć.

PRZECHOWYWANIE

Nawóz przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt. Chronić przed przemarzaniem i przegrzaniem.

Okres ważności: produkt nie traci właściwości nawozowych podczas przechowywania pod warunkiem przestrzegania zasad składowania zawartych w etykiecie.

GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma SUMI AGRO gwarantuje, iż zawartość oryginalnie zamkniętego pojemnika odpowiada zapisom na etykiecie. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w etykiecie. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku stosowania produktu podczas skrajnych warunków pogodowych i glebowych. Użytkownik powinien zwać sobie sprawę z wszelkich zagrożeń związanych z przechowywaniem i stosowaniem tego produktu niezgodnie z zapisami zawartymi w etykiecie.



Importer i Dystrybutor:

Sumi Agro Poland Sp. z o.o.,
ul. Bonifratska 17, 00-203 Warszawa

