

Frutrel

NAWÓZ FORMUŁOWANY

Gwarantowana zawartość:	4,3% azotu (N)
	15% pięcioletku fosforu (P2O5)
	12,5% wapnia (CaO)
	6,2% tlenku magnezowego (MgO)
	3,7% magnezu (Mg)
	2,5% cynku (Zn)
	1,3% boru (B)

Wapniowy nawóz dolistny z wysoką zawartością składników niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin sadowniczych.

Nawóz WE

UWAGA: Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety. Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie u dystrybutora. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.

Producent: Yara Uk Ltd , Pocklington, York YO42 1DN, U.K.
Tel: +44 1759 302545 Fax: +44 1759 303650

Uwaga

H319: Działa drażniąco na oczy.

P280-a: Nosić środki ochrony oczu.

P264-a: Umyć dokładnie ręce po użyciu.

P305: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

P351: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

P338: Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:

P313-a: Zwrócić się o pomoc lekarską.



zawartość netto

10 litrów • masa netto **15,95** kg

Importer:
SUMI AGRO POLAND Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
tel. +48 22 637 32 37, fax: 22 637 32 38
e-mail: biuro@sumiagro.pl, www.sumiagro.pl



Nr partii: Szczegóły znajdują się na opakowaniu.

Frutrel

DAWKI I TERMINY STOSOWANIA

Jablonie: Dawka: 2,5-5 l/ha w fazie różowego pąka. Zabieg powtórzyć w terminie opadania płatków.

W przypadku przedwczesnego opadania liścia (np. w odmianie Golden Delicious) wykonać 2-5 zabiegów w dawce 2,5-5 l/ha począwszy od fazy zawiązywania owoców przez cały sezon wegetacji. Zabiegi wykonywać w odstępie 10-14 dni. Nie stosować na miesiąc przed zbiorem. Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Dawka w przeliczeniu na wielkość korony: 0,05 l nawozu /10 l wody, opryskać 3-5 drzew.

Grusze: Dawka: 2,5-5 l/ha w fazie różowego pąka. Wykonać 2-5 zabiegów w dawce 2,5-5 l/ha począwszy od fazy zawiązywania owoców przez cały sezon wegetacji. Zabiegi wykonywać w odstępie 10-14 dni. Nie stosować na miesiąc przed zbiorem.

Zalecana ilość wody: 200 l/ha
Dawka w przeliczeniu na wielkość korony: 0,05 l nawozu /10 l wody, opryskać 3-5 drzew.

Czereśnie: Dawka: 2,5-5 l/ha w fazie różowego pąka. Wykonać 2-5 zabiegów w dawce 2,5-5 l/ha począwszy od fazy zawiązywania owoców przez cały sezon wegetacji. Zabiegi wykonywać w odstępie 10-14 dni. Nie stosować na miesiąc przed zbiorem.

Zalecana ilość wody: 200 l/ha
Dawka w przeliczeniu na wielkość korony: 0,05 l nawozu /10 l wody, opryskać 3-5 drzew.

Sliwy: Dawka: 2,5-5 l/ha w fazie różowego pąka. Wykonać 2-5 zabiegów w dawce 2,5-5 l/ha począwszy od fazy zawiązywania owoców przez cały sezon wegetacji. Zabiegi wykonywać w odstępie 10-14 dni. Nie stosować na miesiąc przed zbiorem.

Zalecana ilość wody: 200 l/ha
Dawka w przeliczeniu na wielkość korony: 0,05 l nawozu /10 l wody, opryskać 3-5 drzew.

Maliny: Dawka: 5 l/ha na początku fazy wzrostu liści. Powtórzyć dwukrotnie w odstępach 10-14 dni.

Zalecana ilość wody: 200 l/ha

Truskawki (w gruncie): Dawka: 5 l/ha na początku fazy wzrostu liści, powtórzyć dwukrotnie w odstępach 10-14 dni. Można również wykonać 3 zabiegi w dawce 2,5-5 l/ha począwszy od fazy kwitnienia, w odstępach 10 dniowych. Nie stosować na miesiąc przed zbiorem.

Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

ZALECENIA W STOSOWANIU

ZAWSZE STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI ZAWARTYCH W ETYKIECIE
Zawartością opakowania przed użyciem kilkakrotnie wstrząsnąć. Nawóz należy wlewać poprzez filtr do zbiornika opryskiwacza wypełnionego w 3/4 objętości wodą (z włączonym mieszałem). Po uzupełnieniu zbiornika do pełnej objętości wodą utrzymywać pracę mieszadła do zakończenia oprysku. Wszystkie elementy opryskiwacza powinny być czyste i prawidłowo ustawione. Nie należy pozostawiać cieczy roboczej w opryskiwaczu w czasie przerw na posiłki, lub na noc.

Mieszanie z innymi produktami: Należy dokładnie zapoznać się z etykietami produktów i stosować się ściśle do zawartych w nich instrukcji w zakresie łącznego stosowania z innymi produktami. Za działanie łącznie stosowanych produktów odpowiada użytkownik. W przypadku wątpliwości, wskazane jest zastosowanie nieznannej mieszanki na ograniczonym areale. Przed sporządzeniem mieszanki produktów zalecamy kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu.

Środki ostrożności: Nie stosować na uprawy pod osłoniem. Należy unikać skrajnych warunków pogodowych, takich jak: wysoka temperatura, wysoka wilgotność, susza, przymrozek, deszcz. Podczas stosowania produktu używać rękawic i okularów ochronnych. Opryskiwacz należy po zabiegu umyć.

PRZECHOWYWANIE

Nawóz przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt. Chronić przed przemarzaniem i przegrzaniem.

Okres ważności: produkt nie traci właściwości nawozowych podczas przechowywania pod warunkiem przestrzegania zasad składowania zawartych w etykiecie.

Gwarancja stabilności formulacji – 2 lata od daty produkcji. W przypadku pojawienia się osadu na skutek długotrwałego przechowywania (ponad 2 lata) produkt może być zastosowany pod warunkiem przywrócenia pierwotnej formulacji poprzez dokładne wymieszanie.

GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma SUMI AGRO gwarantuje, iż zawartość oryginalnie zamkniętego pojemnika odpowiada zapisom na etykiecie. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w etykiecie. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku stosowania produktu podczas skrajnych warunków pogodowych i glebowych. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z wszelkich zagrożeń związanych z przechowywaniem i stosowaniem tego produktu niezgodnie z zapisami zawartymi w etykiecie.

Importer i Dystrybutor:

Sumi Agro Poland Sp. z o.o.,
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

