

W październiku 2014 r. preparat **Kendo 50 EW** został pozytywnie zaopiniowany przez MRiRW, w efekcie czego **uzyskał rozszerzenie rejestracji** o zastosowanie w uprawach roślin sadowniczych i ozdobnych przeciwko mączniakowi prawdziwemu – bardzo groźnej chorobie zagrażających tym uprawom.

Zastosowanie środka Kendo 50 EW ujęte w zezwoleniu i etykiecie rejestracyjnej z 15 października 2014 r., nr R-379/2014d.

UPRAWA	ZWALCZANE CHOROBY	DAWKA
UPRAWY ROLNICZE		
Pszenvica ozima	mączniak prawdziwy (ogranicza też występowanie: brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy liści, septoriozy plew, fuzariozy kłosów)	0,2-0,3 l/ha
Pszenvica jara	mączniak prawdziwy (ogranicza też występowanie: brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy liści, septoriozy plew, fuzariozy kłosów)	0,2-0,3 l/ha
Jęczmień jary	mączniak prawdziwy (ogranicza też występowanie: plamistości siatkowej liści jęczmienia, rdzy jęczmienia, rynchosporiozy zbóż)	0,2-0,3 l/ha
UPRAWY SADOWNICZE		
Jabłoń	mączniak prawdziwy	0,4-0,5 l/ha
Grusza	mączniak prawdziwy*	0,4-0,5 l/ha
Winorośl	mączniak prawdziwy*	0,15-0,5 l/ha
ROŚLINY OZDOBNE		
Uprawiane w szklarni	mączniak prawdziwy*	0,1-0,2 l/ha

*rejestracja w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Okres karencji (okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej):

- pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary – 48 dni,
- jabłoń, grusza – 14 dni,
- winorośl – 21 dni,
- rośliny ozdobne – nie dotyczy.