

**Producent:**

PHOSYN CHEMICALS Ltd, Pocklington, York YO42 1DN, U.K. Tel: +44 1759 302545  
Fax: +44 1759 303650

**Importer:** Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa  
tel. +48 22 637 32 37, fax: 22 637 32 38, e-mail: [biuro@sumiagro.pl](mailto:biuro@sumiagro.pl), [www.sumiagro.pl](http://www.sumiagro.pl)

# **BORTRAC (B 150 g/l)**

## **NAWÓZ FORMUŁOWANY**

Gwarantowana zawartość:

**10,9% = 150 g/l boru (B) rozpuszczonego w wodzie**

### **Boroetanolamina**

Nawóz formułowany do stosowania nalistnego lub doglebowego. Zaleca się stosowanie w zapobieganiu niedoboru boru oraz dla poprawy wysokości i jakości plonu.

### **Nawóz WE**

**UWAGA:** Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety. Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie u dystrybutora.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.

## **DAWKI I TERMINY STOSOWANIA**

### **STOSOWANIE NALISTNE**

#### **Burak cukrowy, burak ćwikłowy:**

Produkt można stosować

jednokrotnie – w fazie 4 liści właściwych – 1-3 l/ha, lub

dwukrotnie – w fazie 4-6 liści właściwych – 1 l/ha oraz przed

zwarciem międzyrzędzi – 2 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

#### **Rzepak ozimy, rzepak jary:**

Produkt można stosować jednokrotnie

– w fazie wzrostu pędu głównego – 3 l/ha, lub dwukrotnie

– w fazie 4-6 liści właściwych – 1 l/ha,

oraz w fazie wzrostu pędu głównego – 1-2 l/ha.

Nie stosować w okresie kwitnienia.

Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

**Ziemniaki:**

Oprysk dawką 1 l/ha tydzień po całkowitych wschodach roślin na plantacji.  
Przy silniejszych niedoborach zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.  
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

**Kukurydza:**

2-3 l/ha w fazie 6 – liści właściwych.  
Przy silniejszych niedoborach zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.  
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

**Groch, fasola:**

2 l/ha na rośliny wysokości 10-15 cm.  
Przy silniejszych niedoborach zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.  
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

**Kapusta, kapusta brukselska, kalafior, brokuł:**

2-3 l/ha w fazie 4-6 liści właściwych.  
Przy silniejszych niedoborach zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.  
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

**Cebula:**

1 l/ha przy dostatecznie rozwiniętej do przyjęcia oprysku powierzchni liści.  
Zabieg korzystnie jest powtórzyć po 10-14 dniach.  
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

**Marchew:**

3 l/ha na rośliny wysokości 10-15 cm lub przy dostatecznie rozwiniętej do przyjęcia oprysku powierzchni liści.  
Przy silniejszych niedoborach zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.  
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

**Salata (gruntowa):**

1-2 l/ha 10-14 dni po sadzeniu lub wschodach.  
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

**Jabłoń, grusza:**

1 l/ha w fazie różowego pąka i ponownie w czasie opadania płatków kwiatowych.  
2 l/ha po zbiorach owoców ale przed rozpoczęciem żółknięcia (starzenia) liści.  
Zalecana ilość wody: 500-700 l/ha.

**Wiśnia, czereśnia, śliwa:**

1 l/ha w fazie różowego pąka.  
2 l/ha po zbiorach ale przed rozpoczęciem żółknięcia (starzenia) liści.  
Zalecana ilość wody: 500-700 l/ha.

**Truskawki:**

2 zabiegi dawką 1 l/ha: na biały pąk i ponownie po 10-14 dniach.  
Ponadto korzystnie jest wykonać zabieg po zbiorach dawką 2 l/ha.  
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

## **STOSOWANIE DOGLEBOWE**

Wszystkie uprawy: 5 l/ha przed sadzeniem lub przed wschodami w odpowiedniej ilości wody.

## **ZALECENIA W STOSOWANIU**

### **ZAWSZE STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI ZAWARTYCH W ETYKIECIE**

Zawartością opakowania przed użyciem kilkakrotnie wstrząsnąć.

Nawóz należy wlewać poprzez filtr do zbiornika opryskiwacza wypełnionego w 3/4 objętości wodą (z włączonym mieszadłem). Po uzupełnieniu zbiornika do pełnej objętości wodą utrzymywać pracę mieszadła do zakończenia oprysku.

Wszystkie elementy opryskiwacza powinny być czyste i prawidłowo ustawione. Nie należy pozostawiać cieczy roboczej w opryskiwaczu w czasie przerw na posiłki, lub na noc.

**Mieszanie z innymi produktami:** Należy dokładnie zapoznać się z etykietami produktów i stosować się ściśle do zawartych w nich instrukcji w zakresie łącznego stosowania z innymi produktami. Za działanie łącznie stosowanych produktów odpowiada użytkownik.

W przypadku wątpliwości, wskazane jest zastosowanie nieznannej mieszanki na ograniczonym areale. Przed sporządzeniem mieszanki produktów zalecamy kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu.

**Środki ostrożności:** Nie stosować na uprawy pod osłonami. Należy unikać skrajnych warunków pogodowych, takich jak: wysoka temperatura, wysoka wilgotność, susza, przymrozek, deszcz. Podczas stosowania produktu używać rękawic i okularów ochronnych. Opryskiwacz należy po zabiegu umyć.

## **PRZECHOWYWANIE**

Nawóz przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt. Chronić przed przemarzaniem i przegrzaniem.

## **GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ**

Firma PHOSYN CHEMICALS gwarantuje, iż zawartość oryginalnie zamkniętego pojemnika odpowiada zapisom na etykiecie.

Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w etykiecie. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku stosowania produktu podczas skrajnych warunków pogodowych i glebowych. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z wszelkich zagrożeń związanych z przechowywaniem i stosowaniem tego produktu niezgodnie z zapisami zawartymi w etykiecie.