

**Producent:**

Interagro (UK) Ltd., 230 Avenue West, Skyline 120, Great Notley, Braintree, Essex, CM77 7AA, Wielka Brytania; tel: +44 1376 552703; fax:+44 1376 567608, e-mail: [info@interagro.co.uk](mailto:info@interagro.co.uk)

**Importer:**

Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: +48 22 637 32 37, fax: +48 22 637 32 38, e-mail: [biuro@sumiagro.pl](mailto:biuro@sumiagro.pl)

**FLEXI**

Zawiera emulsję karboksylowanego kopolimeru butadienowo-styrenowego

**Atest Nr PZH/HT-2179/2007**

Agroglutynant. Preparat sklejający i powlekający. Zapobiega osypywaniu i porastaniu nasion rzepaku.

**ZASTOSOWANIE:**

Preparat FLEXI ogranicza pęknięcie łuszczyń i osypywanie nasion rzepaku oraz obniża ryzyko porostania nasion przed zbiorem.

**SPOSÓB DZIAŁANIA**

Preparat FLEXI zawiera w swoim składzie emulsję karboksylowanego kopolimeru butadienowo-styrenowego, która po zastosowaniu tworzy cienką powłokę, dzięki czemu łuszczyzny są mniej podatne na pęknięcie i osypywanie nasion.

Po zastosowaniu preparatu FLEXI wszystkie procesy życiowe w roślinach rzepaku zachodzą w sposób niezakłócony, ponieważ kopolimerowa powłoka jest przepuszczalna dla powietrza i pary wodnej, a jednocześnie powłoka ta nie przepuszcza wody opadowej. Dzięki temu łuszczyzny rzepaku szybciej dosychają, a nasiona rzepaku są mniej podatne na porastanie, gdyż nie są narażone na bezpośrednie działanie wody z opadów deszczu i rosy w trakcie dojrzewania.

**TERMIN STOSOWANIA**

Preparat należy stosować około 3 – 4 tygodnie przed zbiorem rzepaku, gdy łuszczyzny zaczynają żółknąć, ale jeszcze są elastyczne i pozwalają się zginać bez pęknięcia (BBCH81-83).

**DAWKOWANIE:**

Zalecana dawka: 0,5 – 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 250 – 400 l/ha.

Dawkę preparatu oraz ilość użytej wody należy dostosować do wielkości roślin i zagęszczenia łąnu.

## **SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ**

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania dokładnie wstrząsnąć.

Odmierzoną ilość preparatu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą z włączonym mieszadłem. Uzpełnić wodą do potrzebnej objętości.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza.

Po pracy aparaturę dokładnie wyczyścić.

## **PRZECHOWYWANIE**

Chronić przed dziećmi.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5<sup>0</sup>C i nie wyższej niż 30<sup>0</sup>C.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

## **WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU**

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Nie wdychać par produktu.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Unikać zrzutów do środowiska; postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

## **UWAGA**

**ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO PREPARACIE DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.**

Data produkcji - .....

Zawartość netto - .....

Nr partii - .....