

# Stopit



## NAWÓZ FORMUŁOWANY

Gwarantowana zawartość - rozpuszczalnego w wodzie: **16,9% tlenku wapnia (CaO)**

### Roztwór chlorku wapnia

Nawóz formułowany do stosowania nalistnego. Zaleca się stosowanie w zapobieganiu niedoboru wapnia oraz dla poprawy wysokości i jakości plonu.

Nawóz WE

**UWAGA:** Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety. Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie u dystrybutora.



Zawiera chlorek wapnia.

Działa drażniąco na oczy.

Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Producent: PHOSYN CHEMICALS Ltd,  
Pocklington, York YO42 1DN, U.K.  
Tel: +44 1759 302545  
Fax: +44 1759 303650

**DRAŻNIĄCY**

zawartość netto

**10** litrów • masa netto **13,27** kg

SUMI AGRO POLAND Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa  
tel. +48 22 637 32 37, fax: 22 637 32 38  
e-mail: [biuro@sumiagro.pl](mailto:biuro@sumiagro.pl), [www.sumiagro.pl](http://www.sumiagro.pl)

Importer:



Nr partii:

# Stopit

## DAWKI I TERMINY STOSOWANIA

**Grusze:** Wykonać 2 - 3 zabiegi w odstępach co 10 - 14 dni w dawce 5 - 10 l/ha od fazy pęknięcia pąków. Ostatni zabieg wykonać nie później niż tydzień przed zbiorem. Zalecana ilość wody: 150 - 500 l/ha.

**Jabłonie:** Regularne zabiegi co 10 - 14 dni w dawce 5 - 10 l/ha od fazy pęknięcia pąków. Ostatni zabieg wykonać nie później niż tydzień przed zbiorem. Zalecana ilość wody: 150 - 500 l/ha.

**Truskawki (gruntowe):** Odmiany nie powtarzające owocowania: wykonać trzy zabiegi w dawce 10 l/ha od początku kwitnienia. Zabiegi powtarzać co 7 - 10 dni. Odmiany powtarzające owocowanie: zalecaną ilość nawozu - 30 l/ha - stosować w dawkach dzielonych; 6 zabiegów w dawce 5 l/ha. Zabiegi wykonywać nie częściej niż co 10 - 14 dni. Zalecana ilość wody: 200 - 600 l/ha.

**Wiśnie, śliwy:** Wykonać dwa zabiegi w dawce 10 l/ha na 4 i na 2 tygodnie przed zbiorem owoców. Zalecana ilość wody: 150 - 500 l/ha.

## ZALECENIA W STOSOWANIU

**ZAWSZE STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI ZAWARTYCH W ETYKIECIE**

Zawartością opakowania przed użyciem kilkakrotnie wstrząsnąć. Nawóz należy wlewać poprzez filtr do zbiornika opryskiwacza wypełnionego w 3/4 objętości wodą (z włączonym mieszadłem). Po uzupełnieniu zbiornika do pełnej objętości wodą utrzymywać pracę mieszadła do zakończenia oprysku. Wszystkie elementy opryskiwacza powinny być czyste i prawidłowo ustawione. Nie należy pozostawiać cieczy roboczej w opryskiwaczu w czasie przerwy na posiłki, lub na noc.

**Mieszanie z innymi produktami:** Należy dokładnie zapoznać się z etykietami produktów i stosować się ściśle do zawartych w nich instrukcji w zakresie łącznego stosowania z innymi produktami. Za działanie łącznie stosowanych produktów odpowiada użytkownik.

W przypadku wątpliwości, wskazane jest zastosowanie nieznannej mieszanki na ograniczonym areale. Przed sporządzeniem mieszanki produktów zalecamy kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu.

Środki ostrożności: Nie stosować na uprawy pod osłonami. Należy unikać skrajnych warunków pogodowych, takich jak: wysoka temperatura, wysoka wilgotność, susza, przymrozek, deszcz. Podczas stosowania produktu używać rękawic i okularów ochronnych. Opryskiwacz należy po zabiegu umyć.

## PRZECHOWYWANIE

Nawóz przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt. Chronić przed przemarzeniem i przegrzaniem.

Okres ważności: produkt nie traci właściwości nawozowych podczas przechowywania pod warunkiem przestrzegania zasad składowania zawartych w etykiecie.

## GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma PHOSYN CHEMICALS gwarantuje, iż zawartość oryginalnie zamkniętego pojemnika odpowiada zapisom na etykiecie. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w etykiecie. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku stosowania produktu podczas skrajnych warunków pogodowych i glebowych. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z wszelkich zagrożeń związanych z przechowywaniem i stosowaniem tego produktu niezgodnie z zapisami zawartymi w etykiecie.

### Importer i Dystrybutor:

Sumi Agro Poland Sp. z o.o.,  
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

