

Producent:

Interagro (UK) Ltd., 230 Avenue West, Skyline 120, Great Notley, Braintree, Essex, CM77 7AA, Wielka Brytania; tel: +44 1376 552703; fax:+44 1376 567608, e-mail: info@interagro.co.uk

Importer:

Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: +48 22 637 32 37, fax: +48 22 637 32 38, e-mail: biuro@sumiagro.pl

FLEXI

Zawiera emulsję karboksylowanego kopolimeru butadienowo-styrenowego

Atest Nr PZH/HT-2696/2012

Agroglutynant. Preparat sklejący i powlekający. Zapobiega osypywaniu i porastaniu nasion rzepaku.

ZASTOSOWANIE:

Preparat FLEXI ogranicza pękanie łuszczyń i osypywanie nasion rzepaku oraz obniża ryzyko porostania nasion przed zbiorem.

SPOSÓB DZIAŁANIA

Preparat FLEXI zawiera w swoim składzie emulsję karboksylowanego kopolimeru butadienowo-styrenowego, która po zastosowaniu tworzy cienką powłokę, dzięki czemu łuszczyzny są mniej podatne na pękanie i osypywanie nasion.

Po zastosowaniu preparatu FLEXI wszystkie procesy życiowe w roślinach rzepaku zachodzą w sposób niezakłócony, ponieważ kopolimerowa powłoka jest przepuszczalna dla powietrza i pary wodnej, a jednocześnie powłoka ta nie przepuszcza wody opadowej. Dzięki temu łuszczyzny rzepaku szybciej dosychają, a nasiona rzepaku są mniej podatne na porastanie, gdyż nie są narażone na bezpośrednie działanie wody z opadów deszczu i rosy w trakcie dojrzewania.

TERMIN STOSOWANIA

Preparat należy stosować około 3 – 4 tygodnie przed zbiorem rzepaku, gdy łuszczyzny zaczynają żółknąć, ale jeszcze są elastyczne i pozwalają się zginać bez pęknięcia (BBCH81-83).

DAWKOWANIE:

Zalecana dawka: 0,5 – 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 250 – 400 l/ha.

Dawkę preparatu oraz ilość użytej wody należy dostosować do wielkości roślin i zagęszczenia łąnu.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania dokładnie wstrząsnąć.

Odmierzoną ilość preparatu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą z włączonym mieszadłem. Uzpełnić wodą do potrzebnej objętości.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza.

Po pracy aparaturę dokładnie wyczyścić.

PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5⁰C i nie wyższej niż 30⁰C.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Nie wdychać par produktu.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Unikać zrzutów do środowiska; postępować zgodnie z etykietą lub kartą charakterystyki.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO PREPARACIE DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -