

**Producent:**

Interagro Ltd., 230 Avenue West, Skyline 120 Great Notley, Braintree, Essex, CM77 7AA, Wielka Brytania; tel: +44 1376 552703; fax:+44 1376 567608, e-mail: [info@interagro.co.uk](mailto:info@interagro.co.uk)

**Importer:**

Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: +48 22 637 32 37, fax: +48 22 637 32 38, e-mail: [biuro@sumiagro.pl](mailto:biuro@sumiagro.pl)

## TOIL

Zawiera estry metylowe kwasów tłuszczowych pochodzenia rzepakowego

**Atest Nr PZH/HT-2699/2012**

Preparat zwilżająco-przyczepny w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej przeznaczony do stosowania z herbicydami w ochronie buraka cukrowego kukurydzy i innych uprawach rolniczych.

Xi



Drażniący

Działa drażniąco na skórę.

**ZASTOSOWANIE:**

Preparat TOIL przeznaczony jest do stosowania łącznie ze środkami chwastobójczymi stosowanymi w uprawie buraka cukrowego, kukurydzy a także innych upraw polowych. Dodatek preparatu TOIL jest szczególnie wskazany w sytuacjach, które określają zapisy w etykiecie-instrukcji stosowania herbicydu.

**SPOSÓB DZIAŁANIA**

Preparat TOIL powoduje:

- obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środków ochrony roślin,
- poprawę równomierności pokrycia powierzchni roślin cieczą użytkową, zwłaszcza roślin trudno zwilżalnych,
- zwiększenie skuteczności i szybkości działania środków ochrony roślin

**DAWKOWANIE:**

Preparat TOIL należy stosować w dawce 1,0 l/ha.

## **SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ**

1. Przygotować określoną ilość cieczy roboczej środka ochrony roślin postępując ściśle według zapisów zawartych w etykiecie-instrukcji stosowania tego środka.
2. Do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą oraz z włączonym mieszadłem, wlać odmierzoną ilość preparatu TOIL.
3. Całość dokładnie wymieszać.
4. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową

### **UWAGI:**

Należy zachować wszelkie przeciwwskazania i uwagi, jakie obowiązują dla środków ochrony roślin, z którymi stosuje się TOIL.

### **PRZECHOWYWANIE**

Chronić przed dziećmi.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5<sup>0</sup>C i nie wyższej niż 30<sup>0</sup>C.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

### **WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU**

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Nie wdychać par produktu.

Unikać zanieczyszczenia skóry.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Unikać zrzutów do środowiska; postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

### **UWAGA**

**ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO  
PREPARACIE DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO  
SUROWCE WTÓRNE**

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - .....

Zawartość netto - .....

Nr partii - .....