

# Molytrac 250

## NAWÓZ FORMUŁOWANY

Molibden - roztwór nawozu (molibdenian sodu)

Gwarantowana zawartość: **15.3% = 250g/l molibden (Mo)**

### Nawóz WE

**UWAGA:** Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety. Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie u dystrybutora. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.

Producent: Yara Uk Ltd, Pocklington, York YO42 1DN, U.K.  
Tel: +44 1759 302545 Fax: +44 1759 303650

#### Uwaga

wersianien czterosodowy

H319: Działa drażniąco na oczy.

H315: Działa drażniąco na skórę.

H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

P280: Nosić rękawice ochronne okulary ochronne.

P260: Nie wdychać gazu ani pary.

P264: Po pracy dokładnie umyć ręce i zanieczyszczoną skórę.

P305: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

P351: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

P338: Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337 + P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

zawartość netto

**1** litrów • masa netto **1,63** kg

Importers:  
SUMI AGRO POLAND Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa  
tel. +48 22 637 32 37, fax: 22 637 32 38  
e-mail: biuro@sumiagro.pl, www.sumiagro.pl



01.2014  
WLPLP87M00

**Rzepak:** Zabieg zapobiegający niedoborom molibdenu - dawka 0,25-0,5 l/ha w początkowej fazie wzrostu pędu głównego. W sytuacji umiarkowanego niedoboru należy wykonać 2 zabiegi w dawce 0,25-0,5 l/ha - w fazie 4-6 liści oraz początkowej fazie wzrostu pędu głównego. Przy dużym niedoborze składników odżywczych wykonać dodatkowy zabieg po 10-14 dniach. Nie stosować w fazie kwitnienia. Zalecana ilość wody: 30-500 l/ha

**Groch, fasola:** Dawka: 0,25-0,5 l/ha w fazie kiedy rośliny osiągają wysokość 5-15 cm. Przy umiarkowanym bądź dużym niedoborze należy powtarzać zabieg w odstępach 10-14 dni. Zalecana ilość wody: 30-200 l/ha.

**Kapustowate:** Dawka: 0,25-0,5 l/ha w fazie 4-6 liści. Przy umiarkowanym bądź dużym niedoborze należy powtarzać zabieg w odstępach 10-14 dni. Zalecana ilość wody: 30-500 l/ha.

**Kalaflor:** Dawka: 0,25-0,5 l/ha w fazie 4-6 liści. Przy umiarkowanym bądź dużym niedoborze zabieg powtórzyć po 10-14 dni lub w fazie formowania główki / rozwoju róży kalaflora. Zalecana ilość wody: 30-500 l/ha. Sadzonki do wysadzania: dawka 5 ml/5 l wody na 1000 sadzonek.

**Por:** Dawka: 0,25-0,5 l/ha dwa tygodnie po posadzeniu lub w przypadku siewu bezpośrednio w pole, kiedy rośliny osiągają 15 cm wysokości. Zabieg powtórzyć 1-2 razy w odstępie 10-14 dni. Zalecana ilość wody: minimum 200 l/ha.

**Cebula:** Dawka: 0,25-0,5 l/ha. Stosować możliwie wcześniej, kiedy powierzchnia liścia osiągnie rozmiar umożliwiającą efektywne wykonanie zabiegu. W razie potrzeby zabieg powtórzyć dwa tygodnie później. Zalecana ilość wody: 50-200 l/ha.

**Uprawy w tunelach:** Dawka: 250 ml na 100 l wody. Termin zabiegu identyczny jak w przypadku tej samej uprawy w gruncie. Zalecana ilość wody: maksymalnie 1000 l/ha.



#### ZALECENIA W STOSOWANIU

**ZAWSZE STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI ZAWARTYCH W ETYKIECIE**

Zawartością opakowania przed użyciem kilkakrotnie wstrząsnąć. Nawóz należy wlewać poprzez filtr do zbiornika opryskiwacza wypełnionego w 3/4 objętości wodą (z włączonym mieszadłem). Po uzupełnieniu zbiornika do pełnej objętości wodą utrzymywać pracę mieszadła do zakończenia oprysku. Wszystkie elementy opryskiwacza powinny być czyste i prawidłowo ustawione. Nie należy pozostawiać cieczy roboczej w opryskiwaczu w czasie przerwy na posiłki, lub na noc.

**Mieszanie z innymi produktami:** Należy dokładnie zapoznać się z etykietami produktów i stosować się ściśle do zawartych w nich instrukcji w zakresie łącznego stosowania z innymi produktami. Za działanie łącznie stosowanych produktów odpowiada użytkownik.

W przypadku wątpliwości, wskazane jest zastosowanie nieznannej mieszanki na ograniczonym areale. Przed sporządzeniem mieszanki produktów zalecamy kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu.

Srodki ostrożności: Nie stosować na uprawy pod osłonami. Należy unikać skrajnych warunków pogodowych, takich jak: wysoka temperatura, wysoka wilgotność, susza, przymrozek, deszcz. Podczas stosowania produktu używać rękawic i okularów ochronnych. Opryskiwacz należy po zabiegu umyć.

#### PRZECHOWYWANIE

Nawóz przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt. Chronić przed przemarzaniem i przegrzaniem.

Okres ważności: produkt nie traci właściwości nawozowych podczas przechowywania pod warunkiem przestrzegania zasad składowania zawartych w etykiecie.

#### GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma SUMI AGRO gwarantuje, iż zawartość oryginalnie zamkniętego pojemnika odpowiada zapisom na etykiecie. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w etykiecie. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku stosowania produktu podczas skrajnych warunków pogodowych i glebowych. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z wszelkich zagrożeń związanych z przechowywaniem i stosowaniem tego produktu niezgodnie z zapisami zawartymi w etykiecie.

Importers i Dystrybutor:  
Sumi Agro Poland Sp. z o.o.,  
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa



Nr partii: Szczegóły znajdują się na opakowaniu.