

HERBICYD

**NOWOŚĆ!**

# Click<sup>®</sup> Premium

## Ochrona kukurydzy najwyższej klasy

### Herbicyd dla wymagających

- Zwalcza szerokie spektrum chwastów jedno- i dwuliściennych.
- Zawiera dwie substancje czynne o różnym mechanizmie działania.
- Zapewnia szerokie okno aplikacji.

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l.







# Click Premium 400 SC

## Herbicyd nalistny przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w kukurydzy.

Click Premium 400 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje czynne – mezotrion i terbutylazynę. Są one pobierane przez liście i korzenie chwastów, hamując ich wzrost i rozwój. Chwasty są niszczone w okresie wschodów oraz po wschodach.

Mezotrion powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w roślinach, w następstwie czego dochodzi do zniszczenia chlorofilu, objawiającego się bieleniem liści. Pierwsze objawy jego działania widoczne są po 5–7 dniach. Terbutylazyna w głównej mierze pobierana jest przez korzenie roślin, powodując chlorozy liści, widoczne w szczególności w przestrzeniach międzynerwowych, a także na brzegach i wierzchołkach. Często symptomy działania nie są nawet zauważalne, gdyż obumieranie chwastów następuje w czasie wschodów. Preparat zabezpiecza też plantację przed zachwaszczeniem wtórnym.

### Korzystaj z zalet Click Premium 400 SC:

-  **Skutecznie zwalcza szerokie spektrum chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.**
-  **Zawiera dwie sprawdzone i wzajemnie uzupełniające się substancje czynne.**
-  **Pozwala na zwalczanie chwastów w szerokim oknie aplikacji – od 2 do 8 liści kukurydzy.**
-  **Nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych po uprzednim wykonaniu orki.**

**Substancje czynne: mezotrion – 70 g/l, terbutylazyna – 330 g/l**

**Formulacja: SC**

| Maksymalna liczba zabiegów   | Dawka                   | Termin zabiegu   |
|--|-------------------------|--|
| 1 zabieg   | 1,5 l/ha                | BBCH 12–18<br>zabieg wykonać od fazy 2. liścia kukurydzy do fazy 8 liści właściwych rośliny uprawnej |
| Skuteczność chwastobójcza  |                         |  |
| Gatunek chwastu  | Skuteczność             |  |
| blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, kurzyślak polny, maruna bezwonna, mlecz polny, przetaczniki, przytulia czepna, psianka czarna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdestówka powojowata, rdest ptasi, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny | +++<br>chwasty wrażliwe |  |

Skuteczność: +++ wyższa lub równa skuteczności najpopularniejszych herbicydów na rynku.

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.  
ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl

