

HERBICYD

ZNANY
I SPRAWDZONY!

Goal[®] 480 SC

Pewne zwycięstwo nad chwastami w uprawie cebuli!

Herbicyd dla urodzonych zwycięzców

- Działa nalistnie i doglebowo.
- Zwalcza chwasty szybko i skutecznie.
- Dla pełnej skuteczności stosuj z adiuwantem olejowym (np. Toil).



Dostępne opakowanie: 0,25 l.



Goal[®] 480 SC

Herbicyd kontaktowy o działaniu nalistnym i doglebowym, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w cebuli uprawianej z siewu.

Po aplikacji tworzy cienki film na powierzchni gleby. W efekcie kiełkujące chwasty zamierają po zetknięciu ze środkiem. Również bezpośredni kontakt herbicydu z liśćmi rosnących chwastów prowadzi do ich zamierania.

Zawarta w Goal 480 SC substancja czynna – oksyfluorofen – powoduje zahamowanie syntezy chlorofilu. Światło uaktywnia jej biologiczne działanie. W miejscu kontaktu środka z rośliną następuje szybkie odwodnienie tkanek. Następnie pojawiają się chlorotyczne plamy, przypominające wyglądem poparzenia i nekrozy, co prowadzi do szybkiego zwalczania chwastów.

Wybierz Goal 480 SC i korzystaj z jego zalet:



Działa dwutorowo na chwasty dwuliścienne – nalistnie i doglebowo.



Szybko i skutecznie zwalcza chwasty – całkowity efekt działania (zasychanie roślin) występuje po ok. 7 dniach.



Nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych po uprzednim wykonaniu orki.

Szczególnie polecany do zwalczania:

przytulii czepnej, szarłatu szorstkiego, tasznika pospolitego, wilczomleczka obrotnego, komosy białej, żótlicy drobnokwiatowej. **Środek stosować do fazy liścieni (najpóźniej do fazy 1 pary liści).**

Substancja czynna: oksyfluorofen 480 g/l

Formulacja: SC

Stosować w systemie dwuzabiegowym	Dawka	Termin
I zabieg	0,05 l/ha	BBCH 13–14 (w fazie wyraźnie widocznych 3–4 liści)
II zabieg	0,05 l/ha	do BBCH 18 (7–10 dni po pierwszym zabiegu)
Skuteczność chwastobójcza		
Gatunek chwastu	Skuteczność	
przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wilczomlecz obrotny	+++ chwasty wrażliwe	
komosa biała, żótlica drobnokwiatowa	++ chwasty średniowrażliwe	

Skuteczność: +++ wyższa lub równa skuteczności najpopularniejszych herbicydów na rynku, ++ dobra.

Środek należy stosować w mieszaninie z adiuwantami olejowymi (np. Toil w dawce 1 l/ha) lub adiuwantami syntetycznymi zawierającymi niejonowe środki powierzchniowo czynne w dawkach zalecanych dla tych adiuwantów. Opryskiwać tylko suche rośliny w dobrej kondycji, po 3–4 dniach słonecznych, w temperaturze nie wyższej niż 23°C.

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.
ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl

