

**Posiadacz zezwolenia:**

Nichino Europe Co. Ltd., 5 Pioneer Court, Vision Park, Histon, Cambridge CB24 9PT, Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel.: +44 1509670743; fax: +44 1509 674938.

**Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:**

Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: + 48 22 637 32 37, fax: + 48 22 637 32 38, e-mail: biuro@sumiagro.pl, www.sumiagro.pl

**Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:**

.....

## ORTUS 05 SC

### Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

**fenpiroksymat** (związek z grupy fenoksypirazoli) – **51,2 g/l (5,02%)**.

Zezwolenie MRiRW nr R- 79/2012 z dnia 13.06.2012 r.,  
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 303/2026d z dnia 12.05.2026 r.



**Uwaga**

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 – Działa drażniąco na oczy.

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/ mydłem.

P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P391- Zebrać wyciek.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKUDOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

**OPIS DZIAŁANIA**

Akarycyd w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków i szpecieli. Zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków. Na roślinie działa powierzchniowo.

## **STOSOWANIE ŚRODKA**

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych (burak cukrowy), sadowniczych i opryskiwaczy ręcznych.

### **Burak cukrowy**

*przędziorek chmielowiec*

**Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha.**

**Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 1,8 l/ha.**

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

Środek można również stosować z dodatkiem adiuwanta w następujących dawkach:

Ortus 05 SC 1,5 l/ha + adiuwant Slippa 0,05%.

Termin stosowania:

Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi do końca wzrostu korzeni (BBCH 39-49) z zachowaniem okresu karencji.

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1**

Zalecana ilość wody: **400 l/ha.**

Opryskiwanie: **ultra drobnokropliste.**

### **Uwagi:**

Środek ogranicza występowanie przędziorka chmielowca w buraku.

Skuteczność zwalczania szkodnika zależy w dużej mierze od technicznej strony zabiegu, która ma na celu dotarcie do miejsc żerowania przędziorków (dolne strony liści), dlatego zaleca się przestrzeganie następujących zaleceń:

- a. Przy sporządzaniu cieczy użytkowej nie obniżać zalecanej ilości wody,
- b. Preparat najlepiej stosować przy użyciu eżektorowych rozpylaczy dwustrumieniowych,
- c. Podczas zabiegu stosować podwyższone ciśnienie robocze – np. 6 barów,
- d. Zaleca się dodatek adiuwanta o działaniu zwilżającym (np. Slippa),

Zwrócić uwagę na dokładne pokrycie cieczą roboczą dolnej strony liści.

### **Jabłoń**

*przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec*

**Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.**

**Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha.**

Termin stosowania:

Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

Liczba zabiegów: 1

*pordzewiacz jabłoniowy*

**Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.**

**Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 – 1,5 l/ha.**

Termin stosowania:

Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: **500 - 1000 l/ha.**

Opryskiwanie: **ultra drobnokropliste.**

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.**

## **Grusza**

*przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec*

**Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.**

**Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.**

Termin stosowania:

Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.

Liczba zabiegów: 1

*podskórnik gruszowy, wzdymacz gruszowy*

**Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.**

**Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,25 l/ha.**

lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach:

Ortus 05 SC 1,0 l/ha + adiuwant Slippa 0,2 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: **500 - 1000 l/ha.**

Opryskiwanie: **ultra drobnokropliste.**

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.**

## **Śliwa**

*przędziorek owocowiec*

**Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.**

Termin stosowania:

Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.

Liczba zabiegów: 1

*pordzewiacz śliwowy*

**Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.**

**Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5 l/ha.**

Termin stosowania: Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: **500 - 1000 l/ha.**

Opryskiwanie: **ultra drobnokropliste.**

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.**

## **Porzeczka czarna**

*wielkopąkowiec porzeczkowy*

**Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.**

lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach:

Ortus 05 SC 1,5 l/ha + adiuwant Slippa 0,1 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od początku do pełni kwitnienia.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: **500 - 1000 l/ha.**

Opryskiwanie: **ultra drobnokropliste.**

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 1**

## **Truskawka**

*roztocz truskawkowiec*

**Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.**

**Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 1,25 l/ha.**

lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach:  
Ortus 05 SC 1,0 l/ha + adiuwant Slippa 0,2 l/ha.

Termin stosowania:

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: **500 - 1000 l/ha.**

Opryskiwanie: **ultra drobnokropliste.**

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.**

## STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH

**Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność  
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych  
ponosi wyłącznie jego użytkownik**

### **Agrest**

*przędziorek chmielowiec*

**Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha**

Termin stosowania:

Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: **500 - 1000 l/ha.**

Opryskiwanie: **ultra drobnokropliste.**

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.**

### **Malina**

*przędziorek chmielowiec*

**Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.**

Termin stosowania:

Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: **500 - 1000 l/ha.**

Opryskiwanie: **ultra drobnokropliste.**

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.**

### **Porzeczka biała**

*wielkopąkowiec porzeczkowy*

**Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.**

lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach:

Ortus 05 SC 1,5 l/ha + adiuwant Slippa 0,1 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować od początku do pełni kwitnienia.

Liczba zabiegów: 1.

*przędziorek chmielowiec*

**Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.**

Termin stosowania:

Środek stosować od pierwszego liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców z zachowaniem okresu karencji.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: **500 - 1000 l/ha.**

Opryskiwanie: **ultra drobnokropliste.**  
**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.**

#### **Porzeczka czarna**

*przędziorek chmielowiec*

**Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.**

Termin stosowania:

Środek stosować od pierwszego liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: **500 - 1000 l/ha.**

Opryskiwanie: **ultra drobnokropliste.**

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.**

#### **Porzeczka czerwona**

*wielkopąkowiec porzeczkowy*

**Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.**

lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach:

Ortus 05 SC 1,5 l/ha + adiuwant Slippa 0,1 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować od początku do pełni kwitnienia.

Liczba zabiegów: 1

*przędziorek chmielowiec*

**Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.**

Termin stosowania:

Środek stosować od pierwszego liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców z zachowaniem okresu karencji.

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: **500 - 1000 l/ha.**

Opryskiwanie: **ultra drobnokropliste.**

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.**

#### **Truskawka**

*przędziorek chmielowiec*

**Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.**

Termin stosowania:

Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: **500 - 1000 l/ha.**

Opryskiwanie: **ultra drobnokropliste.**

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.**

#### **Winorośl**

*przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec*

**Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha.**

**Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,8 l/ha.**

Termin stosowania:

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika. Środek można stosować od pojawienia się pierwszych liści do fazy dojrzewania owoców z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: **500 - 1000 l/ha.**

Opryskiwanie: **ultra drobnokropliste.**

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.**

### **Pomidor uprawiany pod osłonami**

*przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec*

**Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha (lub w stężeniu - 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).**

**Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 2,0 l/ha (lub w stężeniu - 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).**

Termin stosowania:

Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: **1000-2000 l/ha (lub 10-20 l/100 m<sup>2</sup>).**

Opryskiwanie: **ultra drobnokropliste.**

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1**

### **Papryka uprawiana pod osłonami**

*przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec*

**Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha (lub w stężeniu - 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).**

**Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 2,0 l/ha (lub w stężeniu - 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).**

Termin stosowania:

Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: **1000-2000 l/ha (lub 10-20 l/100 m<sup>2</sup>).**

Opryskiwanie: **ultra drobnokropliste.**

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.**

### **Oberżyna uprawiana pod osłonami**

*przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec*

**Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha (lub w stężeniu - 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).**

**Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 2,0 l/ha (lub w stężeniu - 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).**

Termin stosowania:

Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: **1000-2000 l/ha (lub 10-20 l/100 m<sup>2</sup>).**

Opryskiwanie: **ultra drobnokropliste.**

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.**

### **Ogórek uprawiany pod osłonami**

*przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec*

**Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha (lub w stężeniu - 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).**

**Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 2,0 l/ha (lub w stężeniu - 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).**

Termin stosowania:

Środek stosować po wystąpieniu szkodnika od fazy początku rozwoju liści do fazy początku rozwoju owoców (BBCH 11-71).

Zalecana ilość wody: **1000-2000 l/ha (lub 10-20 l/100 m<sup>2</sup>).**

Opryskiwanie: **ultra drobnokropliste.**

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1**

### **Cukinia uprawiana pod osłonami**

*przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec*

**Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha (lub w stężeniu - 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).**

**Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 2,0 l/ha (lub w stężeniu - 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).**

Termin stosowania:

Środek stosować po wystąpieniu szkodnika od fazy początku rozwoju liści do fazy początku rozwoju owoców (BBCH 11-71).

Zalecana ilość wody: **1000-2000 l/ha (lub 10-20 l/100 m<sup>2</sup>).**

Opryskiwanie: **ultra drobnokropliste.**

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.**

#### **Rośliny ozdobne (w gruncie i pod osłonami)**

*przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, przędziorek szklarniowiec.*

**Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha (lub w stężeniu - 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).**

**Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 2,0 l/ha (lub w stężeniu - 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).**

Termin stosowania:

Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

Zalecana ilość wody: **1000-2000 l/ha (10-20 l/100 m<sup>2</sup>).**

Opryskiwanie: **ultra drobnokropliste.**

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1**

#### **Szkółki leśne drzew liściastych**

*przędziorek lipowiec*

**Maksymalna/ zalecana dawka zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha**

Termin stosowania:

Środek stosować po wystąpieniu szkodnika.

Zalecana ilość wody: **300-600 l/ha**

Ilość wody dopasować do wielkości roślin.

Opryskiwanie: **ultra drobnokropliste.**

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2**

Odstęp pomiędzy zabiegami: **co najmniej 7-10 dni.**

#### **Szkółki leśne drzew iglastych**

*przędziorek sosnowiec*

**Maksymalna/ zalecana dawka zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha**

Termin stosowania:

Środek stosować po wystąpieniu szkodnika.

Zalecana ilość wody: **300-600 l/ha**

Ilość wody dopasować do wielkości roślin.

Opryskiwanie: **ultra drobnokropliste.**

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2**

Odstęp pomiędzy zabiegami: **co najmniej 7-10 dni.**

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA**

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

burak cukrowy, winorośl – 28 dni,

jabłoń, grusza, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest - 21 dni,

śliwa, malina - 14 dni,

papryka, ogórek, pomidor, oberżyna, cukinia, truskawka – 7 dni,

rośliny ozdobne, szkółki leśne – nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Roślin buraka cukrowego (korzeni/liści) traktowanych środkiem nie przeznaczać na paszę dla zwierząt.

Opryskiwać całe rośliny, zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.

W przypadku dużego zagęszczenia oraz dużej masy liściowej opryskiwanych roślin, do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający.

Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

Środek zawiera substancję czynną fenpiroksymat – inhibitor oddychania na poziomie komórkowym – (grupa IRAC 21A). Aby zapobiegać zjawisku odporności środek należy stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

W przypadku zastosowania środka na plantacji buraka cukrowego:

Rośliny następcze można siać lub sadzić po upływie 100 dni od zastosowania środka.

W przypadku likwidacji plantacji buraka cukrowego rośliny następcze można siać lub sadzić po upływie 100 dni od zastosowania środka.

Na polach, na których części/liście buraka cukrowego były stosowane jako nawóz zielony, rośliny można wysiewać lub sadzić po upływie 100 dni od zastosowania środka na rośliny buraka cukrowego.

## **SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ**

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.

W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wleciu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

## **POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY**

Resztki cieczy użytkowej należy:

- jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wyczyścić.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH**

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

### **Środki ostrożności dla osób stosujących środek:**

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą podczas wkraczania na obszar poddany zabiegowi. (koszula z długim rękawem i długie spodnie).

Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wносить poza miejsce pracy.

Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):  
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO**

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

**Jabłoń, grusza śliwa, porzeczka czarna, truskawka, agrest, malina, porzeczka biała, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, winorośl, pomidor uprawiany pod osłonami, papryka uprawiana pod osłonami, oierzyna uprawiana pod osłonami, ogórek uprawiany pod osłonami, ogórek uprawiany pod osłonami, cukinia uprawiana pod osłonami, rośliny ozdobne (w gruncie i pod osłonami), szkółki leśne drzew liściastych, szkółki leśne drzew iglastych.**

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 60 metrów od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.

#### **Burak cukrowy**

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych o szerokości:

- 20 m lub,
- 10 m, zadarnionej z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%,

Zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczoł.

**Jabłoń, grusza śliwa, porzeczka czarna, agrest, malina, porzeczka biała, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, winorośl, rośliny ozdobne (w gruncie i pod osłonami), szkółki leśne drzew liściastych, szkółki leśne drzew iglastych.**

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

**Burak cukrowy, truskawka, pomidor uprawiany pod osłonami, papryka uprawiana pod osłonami, oierzyna uprawiana pod osłonami, ogórek uprawiany pod osłonami, ogórek uprawiany pod osłonami, cukinia uprawiana pod osłonami.**

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo

## **WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA**

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
- w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

### **PIERWSZA POMOC**

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody/ mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.

W PRZYPADKUDOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

Okres ważności - 3 lata i 9 miesięcy

Data produkcji - .....

Zawartość netto - .....

Nr partii - .....